


FLUXO DE ATENDIMENTO EM PRONTO ATENDIMENTO PARA SÍNDROME GRIPAL



Pacientes que preenchem critérios para o uso de Antiviral Nirmatrelvir /Ritonavir seguir Fluxo Municipal:

Fluxograma para Notificação, testagem, isolamento, tratamento com indicação de Oseltamivir e critérios para prescrição Antiviral Nirmatrelvir /Ritonavir.

1- Definição de Síndrome Gripal (SG):

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sintomas:

Febre $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$ (ou mesmo relatada), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos, distúrbios gustativos, sintomas gastrointestinais ou mialgia. Em crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, a febre pode estar ausente e devem ser considerados também critérios específicos, de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

3- Sinais de Alarme

-Febre por mais de 72 horas;
-Inapetência/ prostração com dificuldade para se alimentar

4-Sinais de gravidade (SRAG ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sintomas de síndrome gripal associada aos sinais de gravidade)

-FR ≥ 22 irpm ou acima do valor de referência para a idade⁵ ou
-Sinais de desconforto respiratório ou
-Saturação $< 95\%$ em ar ambiente ou
-Cianose labial/facial ou
-Alteração do nível de consciência ou
-Exacerbação de doença pré existente
-Para crianças, os principais sintomas incluem taquidispnéia (maior ou igual a 53 irpm para menor de 1 ano e maior que 37 irpm para maiores que 1 ano), hipoxemia, alteração da consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar/recusa alimentar, letargia, convulsões, batimentos das asas nasais, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

5- Frequência Respiratória de acordo com a idade

Idade	FR (irpm)
1-12 meses	até 53
1-2 anos	até 37
3-5 anos	até 28
6-11 anos	até 25
12-17 anos	até 20
>17 anos	até 22

2- Fatores de risco

Idade ≥ 60 anos;
Gestantes;
Hipertensão;
Diabetes;
Obesidade - IMC > 30 ;
Tabagismo;
Miocardiopatia;
Doença cerebrovascular;
Pneumopatias graves ou descompensadas;
Imunodepressão e imunossupressão
Doenças renais crônicas em estágio avançados (estágios 3,4 e 5)
Doenças crônicas com estado de fragilidade imunológica;
Neoplasia maligna;
Cirrose hepática;
Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia)

6- Indicações de prescrição de Oseltamivir (Iniciar PREFERENCIALMENTE até 48 horas do início dos sintomas)

Grávidas e puérperas (até duas semanas do parto),
Adultos ≥ 60 anos
Crianças < 5 anos
Pneumopatia crônica (inclui asma)
Cardiovasculopatias (exclui HAS)
Nefropatias
Doença hematológica
Distúrbios metabólicos (inclui Diabetes Mellitus)
Síndromes genéticas/transtornos neurológicos
Imunossupressão
Obesidade (IMC ≥ 40)
Uso prolongado de AAS

7- Posologia do Oseltamivir

Droga	Faixa etária	Posologia	
Oseltamivir	Adulto	75mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias	
	Criança maior de 1 ano de idade	$\leq 15\text{kg}$	30mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
		$> 15\text{kg}$ a 23kg	45mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
		$> 23\text{kg}$ a 40kg	60mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
		$> 40\text{kg}$	75mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
	Criança menor de 1 ano de idade	0 a 8 meses	3mg/kg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
9 a 11 meses		3,5mg/kg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias	

8- Recomendações adicionais:

- Usar máscara bem ajustada ao rosto em casa ou em público;
- Evitar contato com imunodeprimidos ou grupos de risco para COVID-19;
- Evitar aglomerações, evitar comer próximo a outras pessoas;
- Não viajar até 10 dias após os sintomas ou testagem negativa.