


FLUXOGRAMA DE PREVENÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPسيا

(Anexo do Protocolo Municipal de Prevenção de Pré-Eclâmpسيا - em Fase de Revisão)



*Conforme novas recomendações da FEBRASGO e da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão e Gravidez.

Fonte: Peraçoli JC, Costa ML, Cavalli RC, de Oliveira LG, Korke HA, Ramos JGL, Martins-Costa SH, de Sousa FLP, Cunha Filho EV, Mesquita MRS, Corrêa Jr MD, Araujo ACPF, Zaconeta AM, Freire CHE, Poli-de Figueiredo CE, Rocha Filho EAP, Sass N. Pré-eclâmpسيا - Protocolo 2023. Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG), 2023

Medicações a serem utilizadas para prevenção de pré-eclâmpسيا:

- Carbonato de Cálcio 1.250mg (500 mg de Cálcio) - **02 comprimidos ao dia fracionados nas refeições. Equivalente a 1000 mg de Cálcio ao dia.**

Não deverá ser utilizado no mesmo horário da suplementação de Ferro.

Deve ser iniciado no 1º trimestre e mantido até o final da gestação.

- Aspirina 100 mg/dia (a noite)

A partir da 12ª semana (preferencialmente antes da 16ª semana, mas podendo iniciar até a 20ª semana). Mantendo até a 36ª semana.

Recomenda-se a suspensão do AAS se diagnóstico de pré-eclâmpسيا.

A posologia e o tempo de uso das medicações devem seguir o Protocolo estabelecido, com atenção em relação à Idade Gestacional).